

TOPOGRAPHIE PELVIENNE

QCM 1

Concernant la topographie pelvienne, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Sur une coupe frontale du petit bassin, les épines iliaques antéro-supérieures sont crâiales par rapport à l'acétabulum
- B. Le périnée fait partie du petit bassin
- C. Le diaphragme uro-génital est constitué uniquement de fascias
- D. Le diaphragme uro-génital est constitué uniquement de muscles
- E. Le muscle obturateur interne a des insertions au niveau du trou obturé

QCM 2

Concernant la topographie pelvienne, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. L'abdomen est séparé du grand bassin par le détroit supérieur
- B. L'abdomen est séparé du grand bassin par le détroit moyen
- C. L'abdomen est séparé du grand bassin par le détroit inférieur
- D. L'abdomen est séparé du grand bassin par le diaphragme uro-génital
- E. L'abdomen est séparé du grand bassin par la ligne interépineuse

QCM 3

Concernant la topographie pelvienne, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le grand bassin est séparé du petit bassin par le détroit supérieur
- B. Le grand bassin est séparé du petit bassin par le détroit moyen
- C. Le grand bassin est séparé du petit bassin par le détroit inférieur
- D. Le grand bassin est séparé du petit bassin par le diaphragme uro-génital
- E. Le grand bassin est séparé du petit bassin par la ligne interépineuse

QCM 4

Concernant la topographie pelvienne, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le petit bassin est séparé du périnée par le détroit supérieur
- B. Le petit bassin est séparé du périnée par le détroit moyen
- C. Le petit bassin est séparé du périnée par le détroit inférieur
- D. Le petit bassin est séparé du périnée par le diaphragme uro-génital
- E. Le petit bassin est séparé du périnée par la ligne interépineuse

QCM 5

Concernant la topographie pelvienne, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le détroit supérieur passe par la partie crâniale de la symphyse pubienne
- B. Le détroit supérieur passe par la partie caudale de la symphyse pubienne
- C. Le détroit supérieur passe au-dessus de la cavité cotyloïdienne
- D. Le détroit supérieur passe par le promontoire coccygien
- E. Le détroit supérieur passe par la jonction S3-S4

QCM 6

Concernant la topographie pelvienne, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le détroit moyen passe par la partie crâniale de la symphyse pubienne
- B. Le détroit moyen passe par la partie caudale de la symphyse pubienne
- C. Le détroit moyen passe au niveau de l'épine sciatique
- D. Le détroit moyen passe par le promontoire
- E. Le détroit moyen passe par la jonction S3-S4

QCM 7

Concernant la topographie pelvienne, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le détroit inférieur passe par la partie caudale de la symphyse pubienne
- B. Le détroit inférieur passe par la partie crâniale de la symphyse pubienne
- C. Le détroit inférieur passe par la grande échancrure sciatique
- D. Le détroit inférieur passe par la pointe du coccyx
- E. Le détroit inférieur passe par l'épine sciatique

QCM 8

Concernant la topographie pelvienne, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Il existe dans le petit bassin une zone située au-dessus du péritoine
- B. Il existe dans le petit bassin une zone sous-péritonéale
- C. Quand la vessie est vide, le péritoine se retrouve dans le petit bassin car il n'adhère pas à la vessie
- D. Grâce au péritoine on peut définir des zones pré-péritonéale, rétro-péritonéales, sous-péritonéale
- E. La zone intra-péritonéale est uniquement située dans l'abdomen

QCM 9

Concernant la topographie pelvienne, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Dans la zone sous-péritonéale, l'axe urètro-vésical est antérieur à l'axe ano-rectal
- B. Dans la zone sous-péritonéale, l'axe urètro-vésical est antérieur à l'axe utéro-vaginal
- C. Dans la zone sous-péritonéale, l'axe urètro-vaginal est antérieur à l'axe ano-rectal
- D. Dans la zone sous-péritonéale, l'axe utéro-vésical est antérieure à l'axe urètro-vaginal
- E. Dans la zone sous-péritonéale, l'axe ano-rectal est postérieur aux deux autres

QCM 10

Concernant la topographie pelvienne, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Les muscles obturateurs internes sont d'origine extra-pelvienne et de terminaison intra-pelvienne
- B. Le diaphragme pelvien laisse passer l'uretère
- C. Le péritoine adhère fortement au dôme vésical
- D. Le sphincter strié de l'urètre est sous-vésical
- E. La vessie se prolonge crânialement et ventralement par l'ouraque

QCM 11

Concernant la topographie pelvienne chez l'homme, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. La prostate se trouve entre les côtés médiaux des muscles élévateurs de l'anus
- B. La prostate se trouve dans les fosses ischio-rectales
- C. Sur une coupe frontale, le canal déférent est supérieur à l'artère ombilicale
- D. Sur une coupe frontale, le canal déférent est latéral par rapport au pédicule obturateur
- E. Sur une coupe frontale, les muscles obturateurs sont médiaux par rapport à l'élévateur de l'anus

QCM 12

Concernant la topographie pelvienne chez la femme, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Sur une coupe sagittale, le pubis est antérieur au rectum
- B. Sur une coupe sagittale, le vagin est inférieur à l'utérus
- C. Sur une coupe sagittale, la vessie est postérieure au vagin
- D. Sur une coupe sagittale, le vagin a une concavité postérieure
- E. Sur une coupe sagittale, l'urètre a une concavité postérieure
- F. Sur une coupe sagittale, l'utérus n'a pas d'angle de flexion
- G. Sur une coupe sagittale, le corps périnéal se trouve entre le rectum et le coccyx
- H. Sur une coupe sagittale, le fornix antérieur est inférieur au fornix postérieur

QCM 13

Concernant la topographie pelvienne chez la femme, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Sur une coupe sagittale, il existe un cul-de-sac pré-vésical formé par le péritoine
- B. Sur une coupe sagittale, il existe un cul-de-sac vesico-utérin formé par le péritoine
- C. Sur une coupe sagittale, il existe un cul-de-sac utéro-vaginal formé par le péritoine
- D. Sur une coupe sagittale, il existe le cul-de-sac de Douglas formé par le péritoine
- E. Sur une coupe sagittale, il existe un cul-de-sac recto-vaginal formé par le péritoine
- F. Sur une coupe sagittale, il existe un cul-de-sac recto-sacral formé par le péritoine

QCM 14

Concernant la topographie pelvienne chez la femme, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le rectum supérieur est péritonisé et intra-péritonéal
- B. Le rectum moyen peut être péritonisé en fonction de la profondeur du cul-de-sac de Denonvilliers
- C. Le rectum inférieur est toujours intra-péritonéal
- D. L'ovaire est intra-péritonéal et non péritonisé
- E. La vessie est extra-péritonéale et péritonisée

QCM 15

Concernant la topographie pelvienne chez la femme, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le fascia pré-vésical dépend du fascia transversalis
- B. Le fascia pré-vésical dépend du fascia superficialis
- C. Le fascia pré-sacral se trouve entre l'espace rétro-sacral et l'espace de Waldeyer
- D. Le fascia recto-vaginal part du cul-de-sac de Douglas et se termine sur le noyau fibreux du périnée
- E. Il existe un fascia de Denonvilliers chez la femme

QCM 16

Concernant la topographie pelvienne chez la femme, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Dans l'espace de Waldeyer on retrouve les veines sacrales moyennes et latérales
- B. Il existe un espace rétro-vaginal et rétro-vésical
- C. Dans l'espace rétro-symphysaire on retrouve des éléments veineux
- D. Dans l'espace pré-vésical on retrouve des éléments veineux
- E. L'espace urètro-vaginal n'existe pas

QCM 17

Concernant la topographie pelvienne chez la femme, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le ligament inguinal fait partie de la musculature du petit bassin
- B. Sur une coupe horizontale du petit bassin, on trouve d'avant en arrière l'urètre, le vagin et le rectum
- C. Les muscles du petit bassin forment un entonnoir, un cône à sommet inférieur
- D. Le muscle principal du diaphragme urogénital est l'élévateur du vagin
- E. Le diaphragme uro-génital est une cavité virtuelle

QCM 18

Concernant la topographie pelvienne chez la femme, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Seul le muscle pubo-coccygien forme le diaphragme pelvien
- B. Seul le muscle ilio-coccygien forme le diaphragme pelvien
- C. Le muscle ischio-coccygien est accessoire
- D. Le muscle ilio-coccygien et le muscle pubo-coccygien sont des muscles intra-pelviens
- E. Les muscles obturateurs et piriformes sont extra-pelviens

QCM 19

Concernant la topographie pelvienne chez la femme, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Sur une coupe coronale au niveau du diaphragme uro-génital, le muscle pubo-coccygien est supérieur au muscle ilio-coccygien
- B. Sur une coupe coronale au niveau du diaphragme uro-génital, le muscle pubo-coccygien est médial par rapport au muscle ilio coccygien
- C. Le muscle pubo-coccygien est tendu de l'ischion au pubis
- D. L'entonnoir pelvien est formé majoritairement par le muscle ischio-coccygien
- E. La partie inférieure du diaphragme pelvien est formée par le muscle pubo-coccygien

QCM 20

Concernant la topographie pelvienne chez la femme, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le diaphragme pelvien est formé par le muscle releveur de l'anus et un muscle accessoire : le muscle ischio-coccygien
- B. Le muscle releveur de l'anus est formé par deux muscles pairs qui sont le pubo-coccygien et l'ilio-coccygien
- C. Les muscles obturateurs et piriformes font partie du releveur de l'anus
- D. La topographie du diaphragme pelvien est presque identique chez l'homme et la femme
- E. Le corps fibreux périnéal se trouve entre l'urètre et le vagin

QCM 21

Concernant la topographie pelvienne chez la femme, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le muscle releveur de l'anus constitue la limite externe du grand bassin
- B. Le diaphragme pelvien est formé par les releveurs de l'anus
- C. Le releveur de l'anus est le seul composant du diaphragme uro-génital
- D. La partie caudale du releveur de l'anus, soit du diaphragme pelvien, est incorporée dans le diaphragme uro-génital
- E. Le diaphragme uro-génital est différent du diaphragme pelvien


QCM 22

Concernant la topographie pelvienne chez la femme, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le muscle pubo coccygien forme des bandelettes autour des éléments qui traversent le diaphragme
- B. Le renforcement latéro-rectal du pubo-coccygien passe en dessous des deux sphincters de l'anus
- C. Il n'y a pas de bandelettes de renforcement entre le vagin et le rectum
- D. La bandelette la plus solide du pubo-coccygien est la bandelette inter-urètre-vaginale
- E. Dans la zone rétro-symphysaire, on retrouve la partie la plus solide du pubo-coccygien

CORRECTION

1	AE
2	E
3	A
4	D
5	ACD
6	BCE
7	AD
8	ABD
9	ABE
10	CDE
11	AC
12	ABDH
13	ABDE
14	ADE
15	ACD
16	BCD
17	BC
18	CDE
19	ABDE
20	ABD
21	BDE
22	A



LABORATOIRE
D'ANATOMIE